

inclinés en arrière, insérés sur les lignes ponctuées et sur les lignes de petits points des intervalles; soies des intervalles un peu plus longues que celles des lignes ponctuées; calus huméraux marqués. Écartement des hanches intermédiaires égal environ à la moitié du diamètre de la hanche. Saillie du premier segment de l'abdomen arrondie; stries fémorales divergentes, presque entières. Dernier article des tarsi antérieurs du mâle denté en dessous.

Espèce voisine de *M. distinguenda* Comolli, plus allongée, probablement encore plus rapproché de *M. floridana* Fall, *Trans. Am. Ent. Soc.*, XXVI, 1899, p. 175, qui, d'après l'auteur, se distingue de *M. distinguenda* par ses élytres plus parallèles et relativement plus étroites par rapport au prothorax. Le *M. nidicola* est beaucoup plus allongé que *M. distinguenda*; ses élytres sont relativement larges par rapport au prothorax et ses tempes sont bien marquées.

Ce Lathridide est très intéressant par son mode d'existence; il vit en effet à titre de commensal dans le nid d'une Arachnide du Mexique, l'Araignée *Mosquero*, que M. Léon Diguët a rencontré dans le Michoacan aux altitudes de 2,000 à 2,500 mètres, espèce nouvelle à laquelle M. Eugène Simon a donné le nom de *Canothele gregalis*<sup>(1)</sup>,

---

COLÉOPTÈRES LAMPYRIDES RAPPORTÉS DE KOUY-TCHEOU,  
RÉGION DE PIV FA (CHINE),

PAR LES P. CAVALERIE ET FORTUNAT,  
NOMMÉS ET DÉCRITS PAR ERNEST OLIVIER.

VESTA IMPRESSICOLLIS Fairm. Un ♂, deux ♀.

Grande espèce voisine de *V. Chevrolati* Cast. de Java, s'en distingue facilement par son abdomen entièrement d'un roux orangé.

VESTA RUFIVENTRIS Motsch. (*Cratolampis*). Un ♂.

Dans mon *Genera* des Lampyrides j'avais mis le genre *Cratolampis* de Motschulsky en synonymie de *Lucerunta* Cast., n'ayant pas à cette époque vu de *Vesta* de l'intérieur de la Chine. L'espèce rapportée par Cavalerie se rapporte bien à la description de l'auteur russe et nécessite la réunion avec les *Vesta* des deux espèces de *Cratolampis* (*rufiventris* et *flavicollis*). *Vestu rufiventris* Motsch. se rapproche beaucoup de *Vesta proxima* Gorh. qui habite les Philippines: la coloration est la même, sauf celle des tibiais

<sup>(1)</sup> Sur l'Araignée *Mosquero*, Notes de MM. K. DIGUËT et ENG. SIMON, *Compt. Rend. Acad. Sc.*, 15 mars 1909, p. 735 et 736.

qui est plus obscure; les élytres sont plus rugueux et le prothorax est largement ogival, tandis que chez *proxima* il est acuminé dans le milieu de son bord antérieur de façon à former un angle assez saillant.

**Vesta enervis** nov. sp. Sept ♂.

Elongata, oblonga, nigra: antennis piceis, pubescentibus, prothorace duplo longioribus, articulis 3-10 longe triangulariter dentatis; prothorace squalide flavo, brevi, antice rotundato, carinato, rugose punctato, plaga quadrata basali lævi; scutello triangulari, pallide flavo; elytris pallidis, prothorace latioribus, ampliatis, ellipticis, elongatis, crebre punctatis, tricostrulatis; pectore, coxis et femorum basi piceis; abdomine nigro, pygidio flavo, trisinuato: 5° et 6° ventris segmentis in medio plaga transversa lucida ornatis, ultimo emarginato, lucido, flavo. — Long., 16-17 millim.

Oblong allongé; corps noir, prothorax et élytres d'un jaunâtre pâle; antennes à rameaux longs, triangulaires aigus, prenant naissance sur toute la longueur de l'article; prothorax court, chargé d'une carène longitudinale, rugueusement ponctué antérieurement et offrant dans la partie médiane de sa base, au-dessus de l'écusson, une plaque quadrangulaire, lisse et généralement plus foncée; élytres longs, plus larges à leur base que le prothorax, s'élargissant régulièrement jusqu'à leur milieu et s'atténuant ensuite en forme d'ellipse allongée, densément ponctué, chargés de trois ou quatre côtes, la seconde à partir de la suture étant la plus saillante; abdomen noir en dessus, sauf le pygidium flave; ventre noir ou brun, les 5° et 6° segments ornés dans leur milieu d'une plaque transversale d'un flave brillant, le dernier entièrement flave.

**LUCERNUTA AMPLISSIMA** ERN. Oliv. Deux ♂.

Décrit sur un exemplaire de la collection Oberthur déjà rapporté de Kouy-Tcheou par l'abbé Largeteau; se trouve aussi au Thibet.

**LAMPROPHORUS MORATOR** ERN. Oliv. Trois ♂.

Décrit sur des exemplaires du Musée de Gênes rapportés des Monts Carin, en Birmanie, par L. Fea. Les diverses espèces de *Lamprophorus* habitent l'Inde, la Chine centrale et les îles Ceylan, Bornéo, Sumatra et Java.

**LAMPROPHORUS YUNNANUS** FAIRM. Quatre ♂.

Décrit du Yunnan.

**Diaphanes exsanguis** nov. sp. Deux ♂.

Elongatus, piceus; antennis prothorace longioribus, compressis; prothorace pallide flavo, parvo, brevi, subogivali, carinato, rugose punctato,

plaga quadrata juxta basali fere laevi et duabus plagis anticis vitreis munito: scutello triangulari, apice truncato, piceo; elytris pallidis, prothorace latioribus, elongatis, subparallelis, rugosis, tricostulatis; pygidio trisinuato, tribus ultimis vestris segmentis lucidis. — Long., 11 millimètres.

D'un brun de poix très clair en dessous; tête et prothorax d'un jaunâtre pâle. Les antennes, comprimées, plus longues que chez les autres espèces du genre, dépassent la longueur du prothorax: ce dernier est étroit, court, chargé d'une carène longitudinale assez saillante et grossièrement ponctué, sauf sur une plaque quadrangulaire au-dessus de l'écusson, qui est presque lisse. Les élytres sont allongés, rugueux, chargés de trois côtes longitudinales en partie obsolètes; le pygidium est sinué; les trois derniers segments du ventre sont ornés dans leur milieu d'une plaque lisse, brillante.

*LUCIOLA OVALIS* Hope. Trois ♂.

Espèce décrite du Népal, abondamment répandue dans l'est de l'Inde, la Birmanie, la Chine, l'Annam, la Cochinchine, le Tonkin, le Cambodge.

*LUCIOLA CHINENSIS* L. Deux ♂.

Espèce très commune dans l'Inde et dans toute l'Asie orientale, qui présente un grand nombre de variations comme ponctuations et nervures des élytres.

*LUCIOLA ANCEYI* Ern. Oliv. Un ♂, deux ♀.

Aussi en Birmanie, au Tonkin, au Cambodge.

*Luciola ficta* nov. sp. Trois ♂.

Oblonga, pubescens, ore piceo, capite et antennis nigris; capite sparsim profunde punctato; prothorace transverso, convexo, subquadrato, lateribus arcuatis, tenuissime punctato, pallide fulvo; scutello conico, punctato, pallido; elytris prothorace vix latioribus, oblongis, elongatis, rugose punctatis, obsolete costulatis, nigris, nitidis, fulvo anguste marginatis et puncto humerali fulvo notatis; pectore piceo, femoribus et tribus ultimis ventris segmentis albidis, ultimo segmento triangulari, apice truncato; tibiis, tarsis et primis ventris segmentis nigris. Longueur, 9 millimètres.

Antennes, tête et élytres noirs, ces derniers ornés d'une petite tache humérale fauve et étroitement bordés de cette même couleur sur tout leur pourtour; élytres rugueusement ponctués, n'ayant que des vestiges de côtes longitudinales; prothorax et fémurs d'un fauve blanchâtre; prothorax très

convexe recouvrant complètement la tête, pointillé, sillonné le long de sa base: tibias, tarsi et ventre, à l'exception des trois derniers segments, noirs.

Cette Luciole a la coloration des parties supérieures analogue à celle de *L. noctivaga* Ern. Oliv., mais elle s'en éloigne par la couleur noire de l'abdomen et par la forme de son prothorax convexe, quadrangulaire, au lieu d'être anguleux dans le milieu de son bord antérieur.

---

DIAGNOSES D'UN COLÉOPTÈRE *HYLOPHILUS*  
ET DE CINQ COLÉOPTÈRES *ANTHICIDES EXOTIQUES* [COL. *HÉTÉROMÈRES*],

PAR MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les Insectes décrits ici font partie de la collection Léon Fairmaire acquise par le Muséum et proviennent : le *Hylophilus*, des chasses de Flohr au Mexique; l'*Anthicomorphus* et les *Tomoderus*, de Singapore<sup>(1)</sup>; enfin l'*Anthicus*, de l'Afrique australe.

***Hylophilus peregrinus* nov. sp.**

Satis elongatus, subnitidus, griseo-pubescentis, supra rufo-testaceus, capite postice scutelloque nigropiceis, elytris ad medium late fusco fasciatis, infra corpore nigro: antennis pedibusque testaceis et gracilibus.

Cette espèce un peu brillante est revêtue d'une pubescence grisâtre non soulevée, peu distincte: elle est noire en-dessous et presque entièrement testacée-roussâtre en-dessus; la tête, un peu plus large que le prothorax, est rousse en avant, noirâtre en arrière, subtronquée postérieurement; les yeux gris moyens sont très éloignés entre eux et ne touchent pas le bord postérieur de la tête; les antennes testacées sont assez longues, grêles à la base, un peu épaissies à l'extrémité: le 2<sup>e</sup> article est plus court que le 3<sup>e</sup> et le dernier à peine plus long que le précédent; le prothorax testacé est en carré long, fortement et densément ponctué, les élytres sont larges, pas très longs, fortement ponctués, dépourvus de dépression nette, testacés-roussâtres et ornés d'une large fascie médiane d'un brun noirâtre sinuée, plus large vers la suture; les pattes sont testacées et grêles. — Longueur, 2 millim. 5.

Mexique: Real del Monte.

Paraît voisin de *H. fragilis* Champ. (*ex description*); en différencierait au moins par les élytres fasciés et les yeux moins grands.

<sup>(1)</sup> Peut-être ces espèces proviennent-elles des chasses de Raffray.